

【上部・下部消化管内視鏡検査（胃・大腸カメラ）のご案内】

- 当院で下剤を飲まれる方は、**朝9時**にご来院下さい。
- 自宅で下剤を飲まれる方は、**朝9時30分**から内服を開始して下さい。

検査時間の **30分前**（ : ）にご来院下さい。

※モビプレップを3セット内服されましたら、携帯090-1581-5900にご連絡をお願いいたします。

※排便状況により時間が前後することがありますので、ご了承下さい。

検査当日

- 問診票、同意書（事前にホームページからダウンロードされ、記入された方のみ。）
- お薬手帳など現在の処方薬がわかるもの
- 診察券、保険証、ある方は健診・検診結果を持参下さい。
- モビプレップ服用・排便チェックシート（自宅で下剤を飲まれる方のみ）
- 雑誌、本、音楽、パソコンなどの娯楽品（当院で下剤を飲まれる方のみ）

※鎮静剤、鎮痛剤を使用される場合は、**検査後は眠気が残ることがありますので、車、バイク、自転車でのご来院はご遠慮下さい。**公共交通機関でご来院下さい。

ご高齢者の方は、家族同伴を推奨、送り迎えだけでも可です。

注意事項

★食事について

検査前日は、検査食もしくは消化の良いものを食べましょう。ただし、**20時以降**は絶食です。元々便秘の方や大腸カメラの検査時に便が残っているとされたことがある方は、2～3日前から消化の良いものを食べて下さい。水分は多めに摂取して下さい。

検査当日は **朝から絶食** です。

飲水は起床時にコップ2～3杯の水、スポーツドリンクは可能です。

★内服薬について

大腸カメラ **検査前日の夜に2種類の下剤（液体と錠剤）** を飲んで下さい。

※液体の下剤は、10ml全量コップに移し、30～50mlの水で薄めて服用して下さい。

服用後は水分をしっかり摂取するようにして下さい。

普段飲んでいるお薬は、前日まで通常通り服用して下さい。

- 血圧の薬など継続して内服が必要な薬のある方は、検査当日の**午前7時**までに内服して下さい。※継続する薬は処方医にご確認下さい。

- 糖尿病薬は、中止して下さい。

- 血液をさらさらにする薬（ワーファリンやバイアスピリンなど）を服用中の方は自己判断で中止せず、処方医に確認し指示にて従って下さい。

数種類飲んでいるケースは、観察のみの検査になることがあります。

検査後について

鎮静剤、鎮痛剤を使用される方は、検査終了後にリカバリー室で30分～60分休んで頂く必要があります。また、検査後の仕事や重要な決定事項に関わるのは避け、ご自宅で安静にして下さい。使用されない方は、検査が終了しましたらご帰宅頂けます。

☆ 都合が悪くなり、ご来院できない方は、クリニックが開いている時間帯にご連絡下さい。

☆ 当院はクレジットカードが使用できませんので、ご了承下さい。

このしたクリニック 電話06-6318-7610